

Carcinoma processus alveolaris superioris.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

in der

Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des Herrn Geheimrates

PROF. RITTER VON NUSSBAUM

der

medizinischen Facultät

der

kgl. Ludwig-Maximilians-Universität München

vorgelegt von

MAX STÖTTNER,

appr. Arzt aus Vohburg.

München, 1884.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Carcinoma processus alveolaris superioris.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

in der

Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des Herrn Geheimrates

PROF. RITTER VON NUSSBAUM

der

medizinischen Facultät

der

kgl. Ludwig-Maximilians-Universität München

vorgelegt von

MAX STÖTTNER,

appr. Arzt aus Vohburg.

München, 1884.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Digitized by the Internet Archive
in 2026



Unter den vielen pathologischen Proceffen, die sich auf dem Oberkiefer und seinen Weichteilen abspielen, nehmen die Neoplasmen eine nicht unbedeutende Stelle ein, sowol hinsichtlich der Wichtigkeit der durch sie hervorgerufenen Symptome und Störungen, als auch insbesondere wegen der Häufigkeit, mit der die Geschwülste gerade auf diesem relativ so eng begrenzten Gebiete aufzutreten pflegen.

Haben doch nach Billroth-Pitha 10% von den Geschwülsten des Gesamtkörpers ihren Sitz im Gesicht und Oberkiefer.

Nur ein geringes Contingent davon gehört zu den klinisch unschuldigen Formen; die bei weitem grösste Zahl der hier in Frage kommenden Tumoren trägt einen durchaus bösartigen Character. Und namentlich häufig ist diejenige Geschwulstart, mit deren Begriff gerade die Malignität verbunden ist, das Carcinom.

Im «Archiv für klinische Chirurgie. Band XXV» hat Gurlt in Berlin eine Summe von Geschwülsten, wie sie vor ihm noch keinem Autor zur Verfügung stand, je nach ihrer histologisch-anatomischen Beschaffenheit und nach ihrem Sitze tabellarisch zusammengestellt. Von 14,630 Neubildungen treffen 1831 auf Gesicht und Oberkiefer, und 1367 also 74,6% dieser Neoplasmen sind Carcinome.

Man ist jetzt fast einig die Ursache des Carcinom's in mechanischen Insulten zu suchen, dasselbe gleichsam als den Aus-

fluß einer durch langdauernde, aber geringgradige Reizung bedingten Gewebshyperämie zu betrachten.

Auf diese Weise hat man sich das häufige Vorkommen des Unterlippen- und Zungenkrebses bei der männlichen und bäuerischen Bevölkerung erklärt einestheils aus der Mißhandlung, der ersteres Organ beim Rasiren ausgesetzt sei, anderntheils aus der Einwirkung des ätzenden Tabaksaftes, mit dem Zunge und Unterlippe beim pfeifenrauchenden Manne fortwährend überfluthet werde. Vielleicht wird hier doch dem Dorfbader und dem braunen Saft der *Herba Nicotiana* zuviel aufgebürdet. Der Krebs sitzt doch in der Mehrzahl der Fälle am Uebergang der Haut ins Lippenrot, also an einer Stelle, wo die Wirksamkeit des Scherrmessers am wenigsten in Betracht kommt; und von der Tabaksjauche wird die Unterlippe und Zunge doch auch nicht mehr beschmiert als das Zahnfleisch. Aber Carcinom an diesem Platze gehört zu den größten Seltenheiten, obwol der Zahnfortsatz außerdem noch ganz besonderen Schädlichkeiten preisgegeben ist.

Schon der natürliche Akt des Kauens und Schluckens stellt in thermischer und mechanischer Beziehung an diesen Teil große Anforderungen und nicht geringer sind die Umbilden, welche die Reinigung der Zähne mit sich bringt. Zahnpulver und Zahnwässer vereinigen sich mit der möglichst rauhen und steifen Zahnbürste zu einer gemeinfamen und meist blutigen Tortur des Zahnfleisches. Kommen dann, wie so häufig in späterer Lebenszeit, hiezu noch die Jahre lang andauernden Reize, die kariöse Zähne auf ihre knöchernen Fächer und auf die Weichteilumhüllungen ausüben, oder die Infulte, welche durch das Tragen von künstlichen Gebissen nicht minder als durch massenhafte Anhäufung des Zahnsteines veranlaßt werden, berücksichtigt man ferner die nach Verlust der Zähne statthabende hochgradige Atrophie des Kiefers und die dadurch bedingte Herabsetzung seiner Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse, so ergibt das eine Reihe von Momenten, welche ge-

wils geeignet sind, am Proceßus alveolaris eine Disposition für Neubildungen wie das Carcinom vorauszusetzen.

Wir werden sehen, wie die Wirklichkeit dieser Erwartung entspricht.

Bei dem in früheren Zeiten so fühlbaren Mangel einer prägnanten Definition des Krebses ist es sehr schwer, ältere Mitteilungen über diesen Gegenstand zu statistischen Zwecken zu verwerten.

Denn die eigentümliche Natur des Carcinoms — das die verschiedensten Formen zeigt vom markweichen Encephaloid und Gallertkrebs an bis zum steinharten Scirrhus und Osteocarcinom, dessen histiologische Elemente selbst so wechselnd sind wie seine makroskopischen Gestaltungen und dessen klinischer Charakter eine Reichhaltigkeit von Symptomen darbietet, wie keine andere Geschwulst, das des enormsten Wachstums und der ausgebreitetsten Nekrose fähig ist, das der Fettmetamorphose und Colloiddegeneration so häufig anheimfällt wie der schleimigen und kalkigen Entartung, — dieses proteusartige, ewig wechselvolle Bild der carcinomatösen Wucherung hat es mit sich gebracht, daß bis in die letzten Jahre noch unter dem Namen Krebs alle möglichen Tumoren beschrieben und verstanden wurden.

Und so ist die erste brauchbare und auf eine größere Reihe von Fällen basirte Statistik über Oberkieferkrebs ziemlich neuen Datums. Sie findet sich in einer Monographie von Dr. O. Heyfelder («Die Resektion des Oberkiefers»). Es sind darin nicht nur die verschiedenen Operationsmethoden genau beschrieben, sondern meist auch der primäre Sitz der Neubildung näher bezeichnet.

Von 308 mehr oder weniger ausführlich mitgeteilten Oberkieferresektionen nun wurden 55 Operationen ausgeführt wegen Carcinom. Dasselbe hatte in einer großen Zahl der Fälle seinen Ausgang von der Schleimhaut der Highmorshöhle genommen, ebensohäufig hatte es von den Weichteilen des Gesichtes und

der Nase aus auf den Knochen übergegriffen; aber nur in 4 Fällen von den 55 Operationen war Carcinom des Processus alveolaris superior die Indikation zum Eingriff. Diese Fälle sind folgende:

1*) Ein 51 jähriger Mann verspürte seit 25 Jahren beim Kauen lebhafte Schmerzen auf der linken Seite des Oberkiefers. Vor 2 Jahren fing der letzte Backenzahn an, locker zu werden und fiel dann aus, ohne schlecht zu sein. Die Schmerzen steigerten sich namentlich in den letzten 9 Monaten, alle Zähne der leidenden Seite fielen aus.

Als der Kranke von Michon gesehen wurde, war der linke Alveolarrand von einem unebenen, leicht blutenden, mit Granulationen bedeckten Geschwür eingenommen, das dem äußeren Ansehen und dem mikroskopischen Befund nach Epithelialkrebs war. Auch der harte Gaumen derselben Seite war angegriffen.

Die Resektion der erkrankten Teile hatte bleibende Heilung zur Folge.

2**) E. Soulé in Bordeaux nahm im Juli 1851 einen 3jährigen Kranken ins Hospital St. Andie auf, welcher einen umfangreichen, unebenen Tumor des rechten Oberkiefers zeigte; der ganze Alveolarfortsatz war verdickt, der harte Gaumen rechts erweicht, nach aufsen fassen hahnenkammartige leichtblutende Excrescenzen auf. Die Zähne waren erhalten, der Kranke durch wiederholte Blutungen anämisch. Die Diagnose eines Epithelialkrebses ward durch das Mikroskop bestätigt. Mit Spaltung der Wange amputirte Soulé den rechten Oberkiefer und wandte das Cauterium actuale an. Schnelle Heilung. Nach 3 Monaten Recidive. Exstirpation und Cauterisation. Nach 2 Jahren abermalige Recidive am oberen Theile der Nasenhöhle, d. h. am Processus nasalis des Oberkieferbeines, wobei die Narbe intakt geblieben war. Abtragung und Cau-

*) Gaz. des hôp. 1853 pag. 178.

**) Gaz. des hôp. 1854 pag. 46.

terifation im März 1853. Dritte Recidive an der Oberlippe auf der Narbe der ersten Operationswunde. Abtragung und Cauterisation im Jahre 1854.

3 *) Wilms exstirpirte bei einem 56jährigen Manne den hintern Teil des Alveolarfortsatzes wegen eines an demselben aufsitzenden, seit 2 Jahren bestehenden Cancroids mittelst der Velpeau'schen Knochenzange und dem Meißel unter Anwendung des Wangenschnittes. Heilung durch prima intentio, Vernarbung der Knochenwunde in 10 Wochen. Ueber die Dauer des Erfolges ist nichts gesagt.

4 **) Peter Eichler, 66 Jahre alt, litt an Krebs des Unterkiefers und des Alveolarfortsatzes des linken Oberkiefers. Letzterer, sowie der freie Rand des Unterkiefers wurde von J. F. Heyfelder mit der Liston'schen Knochenzange abgetragen und die linke Unterkieferhälfte exartikuliert, wozu ein am äußern und untern Rande des aufsteigenden und horizontalen Teiles der Mandibula geführter Schnitt den Weg bahnte. Nach der Operation befand sich der Kranke gut, erlag aber am 5. Tage einer die großen Gefäße, Luftröhre und Larynx umgebenden, vom hintern Teil des Sternums ausgehenden Krebsgeschwulst.

Einige Jahre nach Heyfelder stellte Herrmann Hugo Boffe in einer Differtation***) 116 Fälle von Oberkieferrefektionen zusammen. Hier war 35mal Carcinom die Veranlassung zur Operation, darunter nachstehende 3 Carcinome des Proceffus alveolaris.

5) Seite 21. Mann, 49 Jahre alt, 9 Wochen vor der Aufnahme ins Hospital unter starkem Schmerz Bildung eines fleischig aussehenden Körpers an der Alveole des zweiten rechten Backenzahnes. Die Zähne werden schnell los und fallen aus; der Tumor wird zweimal geätzt, wächst aber nun um

*) «Refektion des Oberkiefers von Dr. O. Heyfelder.» Seite 36.

**) «Refektion des Oberkiefers von Dr. O. Heyfelder.» Seite 95.

***) «Beiträge zur Lehre von der Refektion des Oberkiefers.» Dorpat 1865.

so schneller. Die Anamnese ergibt Krebs in den weiblichen Teilen der Familie. Schnitt: vorderer Lateralchnitt über den Tumor hinweg, der so weich war, daß das Messer tief eindrang; hinterer Wangenschnitt.

Lappen nach oben zurückpräparirt; der Tumor ist weich, gallertartig und nimmt den ganzen hintern Teil des Knochens ein. Darauf wird die Raphe palatina, dann die übrigen Fortsätze mit der Listonschen Scheere getrennt; hierauf der Tumor, der sehr groß war, mit einer (Lionforceps) Zange gefaßt, in 2 Hälften geschnitten und so entfernt. Die Höhle wird mit dem Ferrum candens kauterisirt und mit Bourdonnets ausgefüllt. Vollkommene Heilung nach 9 Monaten. Kein Recidiv.

6) Seite 56. Weib, 34 Jahre alt.

Krebs des linken Alveolarrandes. Ohne Trennung der Weichteile wurde der Alveolarfortsatz in der Lücke des Eckzahnes mit der Stichfäße eingefügt $\frac{3}{4}$ " nach oben, dann Horizontalschnitt von aussen mit dem Osteotom. Die Trennung vom Gaumen mit demselben Instrument. Sehr geringe Reaktion. Geheilt entlassen nach 16 Tagen.

7) Seite 90. Mann 57 Jahre alt.

Epithelialkrebs des rechten Zahn- und Gaumenfortsatzes. Es mußte die ganze rechtseitige Hälfte des harten Gaumens, der ganze Alveolarfortsatz und ein Teil der Facialwand reseziert werden. Die Lippen- und Gesichtshaut wird geschont. Schnitt: Nach Extraktion des Augenzahnes von der Alveole desselben schräg zur Mittellinie des harten Gaumens bis zum Velum palatinum. Die Schleimhaut der Wange, wo sie auf den Oberkiefer übergeht, wird durchschnitten und Wange und Nasenflügel bis zum Foramen infraorbitale zurückpräparirt. Dann Stichfäße in die Nasenhöhle und Durchfäße des Alveolar- und Gaumenfortsatzes in der Richtung des ersten Schnittes. Dann von der Nasenhöhle aus horizontale Durchfäße bis in die Fossa palatina. Dann wurde das Gaumensegel abgeschnitten und das resezierte Stück entfernt. Der Defekt

im rechten harten Gaumen ward durch Uranoplastik ersetzt, indem der mucös-periostale Ueberzug des linken Gaumenfortsatzes lospräparirt wurde, sodafs vorne und hinten eine Ernährungsbrücke blieb und diese wurde an den aufgefrischten Narbenrand des linken Gaumenfortsatzes und an die wundgemachte Grenze der Lippen-Wangenschleimhaut des Oberkiefers und der Nasenhohle angenäht. Die Operation mußte wiederholt werden, da Patient irrsinnig geworden war und alle Erfolge durch sein Benehmen vereitelte. Der Erfolg war immerhin ein ausgezeichnete, da nur nach hinten und aufsen ein kleiner Defekt blieb, der gar nicht genirte. Die Heilung war dauernd.

Unter 12 Carcinomen, welche Anzeige einer Oberkieferrefektion waren und die L. Siebert in einer Differtation*) beschreibt, war der Zahnfortsatz einmal der ursprüngliche Herd der Erkrankung.

8) Seite 24. Steingruber Gottlieb, 52jähriger Seiler wurde am 20. Januar 1868 wegen eines Epithelioms des Alveolarfortsatzes beider Oberkiefer aufgenommen. Es wurde ausgeführt die Refektion der unteren Hälfte des linken Oberkiefers und Refektion des Alveolarfortsatzes des rechten Oberkiefers bis zum 1. Backzahn. Längsschnitt seitlich der Nase, Kettenfäge, Knochenbohrer und schneidende Knochenzange. Am 8. Februar wurde Patient geheilt entlassen.

Eine große Reihe von Oberkieferrefektionen veröffentlichte in neuerer Zeit Dr. L. Rabe**). In dieser Publikation sind 305 Operationen aufgeführt. Bringt man hiebei die von Siebert erwähnten Fälle, die Rabe ebenfalls zu seiner Statistik mit verwertet hat, in Abzug, so bleiben noch 83 Carcinome als Indikation der angenommenen Oberkieferentfernung. Nur

*) «Statistik der Refektionen, welche von Hr. Geh. Hofrat Professor Dr. F. Ried in der chir. Klinik zu Jena ausgeführt wurden.» Jena 1868.

**) «Statistische und klinische Beiträge zu der Prognose der Refektionen am Oberkiefer.» Deutsche Zeitschrift für Chirurgie Bd. III. S. 300—354. 1873.

2mal hatte das Aftergebilde feinen Ausgang am Processus alveolaris.

9) Seite 325. Langenbeck operirte eine 45jährige Frau wegen eines Cancroids des Alveolarfortsatzes. Während der Operation starb Patientin an Suffocation, indem wahrscheinlich Blut in die Trachea floss und so Erstickung veranlafste. Die Section wurde nicht gestattet.

10) Seite 326. Bei einem 40 jährigen Manne resecirte Billroth den Processus alveolaris super. wegen eines Carcinoms. Die Wucherung hatte vor 4 Monaten hinten am rechten Zahnfortsatze sich entwickelt und war zur Zeit der Operation bereits ulcerirt. Die Excision geschah mittelst Knochenzange und Ferrum candens. Recidive bald nach Schluß der Wunde an der Operationsstelle und in einer Lymphdrüse am Kieferwinkel. Kauterisation mit Ferrum candens vom Munde aus. Exstirpation der Drüse am Kieferwinkel 4 Wochen später. 3 Wochen darauf wurde Patient mit heilender Wunde entlassen. Die Heilung war dauernd.

Nur eine annähernde Vorstellung von der Häufigkeit des Krebses am Oberkiefer, speziell am Zahnfortsatz desselben können obige Zahlen uns verschaffen. Denn all diese Angaben betreffen nur ausgeführte Operationen und lassen diejenigen Fälle unberücksichtigt, bei denen die Operation theils vom Patienten verweigert theils vom Operateur refusirt wurde wegen zu großer Ausdehnung der krebigen Entartung.

Dafs aber gerade solche »nicht operirte« Fälle eine nicht unbeträchtliche Summe ausmachen, zeigt nachstehende Tabelle von Oberkiefercarcinomen,*) die in der kgl. chirurgischen Poliklinik zu München in der Zeit vom 1. August 1879 — 1. April 1884 zur Beobachtung kamen und welche Schreiber dieses grösstenteils persönlich kennen lernte.

*) D. h. Carcinome, bei deren etwaiger Exstirpation Teile des Oberkieferknochen hätten mitresecir werden müssen.

Laufende Nr.	Hauptbuch Nr.	Alter	Geschlecht	Sitz des Carcinom.	Eventuelle Therapie.
1879					
1	2918	59	— W	Linke Nasenwurzel	Operation verweigert.
1880					
2	541	80	M —	Nasenwurzel und innerer Augenwinkel	Operation verweigert.
3	1072	75	— W	Schläfe und Nase	Inoperabel.
4	1149	50	— W	Rechte Nasenseite vom innern rechten Augenwinkel bis zum rechten Nasenflügel 2—3 cm breit	Exstirpation. Deckung des Defekts mittelst Stirnlappen.
5	1172	63	— W	Linke Nasenseite	Operation verweigert.
6	1656	70	— W	Rechte Nasenhälfte und Zahnfortsatz	Operation verweigert.
7	3051	61	M —	Orbita sinistra	Inoperabel.
8	3755	40	— W	Linke Nase und Septum.	Operation verweigert.
9	3794	75	M —	Linker unterer Augenrand, Wange und linke Nasenhälfte	Operation verweigert.
1881					
10	1347	76	— W	Maxilla sup. dext. seit 3 Monaten, am Gaumen aufgebrochen, Schwellung bis in die Jochbeingegegend	Operation verweigert.
11	2219	53	— W	Rechter Nasenrücken	Exstirpation.
12	2963	84	— W	Linker innerer Augenwinkel und Nasenwurzel, Thalergröfs	Operation verweigert.
13	3559	74	— W	Recidive an der Regio zygomatica et palpebr. infer. dext. Hühnereigröfs. Das primäre Oberlippen-carcinom war vor $\frac{3}{4}$ Jahren exstirpiert worden	Operation wegen Körperschwäche kontraindicirt.
14	4538	61	M —	Linke Nasenhälfte	Operation verweigert.
15	4764	61	— W	Margo infraorbital. 2 cm lang, 1,5 cm breit	Operation verweigert.
1882					
16	1579	57	— W	Rechte Nasenhälfte, Wange und Oberlippe	Operation verweigert.
17	1604	69	M —	Linke Jochbeingegegend, Wange und Ohrmuschel, seit $\frac{1}{2}$ Jahr nach Pferdebiß	Exstirpation, Plastik nach Riverdin.
1883					
18	784	62	— W	Völliger Defekt der Nase durch carcinomatöse Zerstörung	Operation verweigert.
19	5420	60	M —	Nasenrücken und Cornea	Excision, Enucleation, Riverd. Transplantat.
20	6042	58	M —	Processus alveolar. sup. dext. seit $\frac{1}{2}$ Jahr	Refektion d. unt. Theils beider Oberkieferkn.
21	6621	78	M —	Carcinoma orbit. dext. et palpebr. duar. dext. seit 4 Jahren	Operation verweigert.
1884					
22	448	77	M —	Linke Nasenhälfte seit 5 Jahren aus einer Aknepustel	Operation verweigert.
23	1174	51	— W	Rechte Nasenhälfte, Markstückgröfs	Operation verweigert.

Der einzige Fall von primärem Carcinom des Proceffus alveolaris, der unter den aufgeführten, mehr oder weniger auf den Knochen übergreifenden Oberkieferkrebsen erwähnt ist und der auch die Veranlassung zu dieser Publikation gab, Fall Nr. 20, dürfte nicht nur interessant sein durch die eigentümliche Todesursache, welche hier unerwartet dem günstigen Heilungsverlauf ein Ende setzte, sondern auch Beachtung verdienen durch eine besondere Nachbehandlungsart mittelst provisorischer Prothese, welche sofort nach beendeter Operation eingelegt wurde. Es sei deshalb gestattet, die Krankengeschichte etwas ausführlicher mitzuteilen:

11) S. Michael, Oekonom, 58 Jahre alt, ein kräftig gebauter, muskulöser Mann, der sich während seines ganzen Lebens einer ausgezeichneten Gesundheit erfreute, bemerkte im Frühjahr 1883 kleine, fleischrote, warzige Wucherungen am Zahnfleisch des rechten Oberkiefers. Selbe hatten bis dahin so wenig Beschwerden verursacht, daß Patient erst durch seine Familienangehörigen, denen der foetide Atemgeruch des Vaters auffiel, auf die Neubildung aufmerksam gemacht werden mußte. Trotz verschiedener Mund- und Gurgelwässer, trotz Aetzungen und Einpinselungen nahmen die Excrescenzen langsam aber stetig an GröÙe und Umfang zu, und hoben und lockerten schließlich die noch vorhandenen Zähne, so daß diese sämtlich aus ihren Fächern mittelst der Finger extrahiert werden konnten.

Schmerzen waren nie vorhanden gewesen und das einzige unangenehme Symptom nur der üble Geruch aus dem Munde. Erst in allerletzter Zeit, nachdem die Geschwulst ein rascheres Wachstum angenommen hatte, wurde sie durch ihre GröÙe als mechanisches Hinderniß beim Schlucken und Sprechen lästig. Dieser Umstand hauptsächlich veranlaßte ihn auch jetzt ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Status praesens am 24. November 1883.

Es fällt bei der Untersuchung äußerlich im Gesicht durchaus keine Anschwellung oder sonstige Veränderung in die Augen.

Oeffnet der Kranke aber den Mund, so drängt sich sofort unter der Oberlippe ein blaßroter, daumendicker Fleischwulst hervor, dessen Basis der rechte obere Zahnfortsatz abgibt. Alles Zahnfleisch in dieser Ausdehnung ist völlig in eine Geschwulstmasse aufgegangen, die vom 1. rechten Mahl- bis zum vordern rechten Schneidezahn reicht und am innern Alveolarrand ziemlich diffus und ohne deutliche Grenze in die Schleimhaut des harten Gaumens übergeht, dagegen am äußern Alveolarrand sich scharf von der gefunden Schleimhaut der Oberlippe und Wange absetzt. An der Oberfläche erscheint die Neubildung körnig granulirt, nur teilweise noch mit Epithel bekleidet, dafür an einzelnen Stellen durch zerfallene Granulationen mit gelblichen, nekrotischen Gewebsetzen bedeckt.

Im ganzen Oberkiefer ist kein Zahn mehr vorhanden, die Zahnfächer durchweg geschlossen. Nur der Alveole des rechten obern Eckzahnes entsprechend findet man eine mit fleischigen Wucherungen teilweise verschlossene Fistelöffnung, durch welche eine stricknadeldicke Sonde in die Kieferhöhle hineingeführt und diese als freie Höhle abgetastet werden kann.

In beiden Submaxillarregionen sind mehrere harte bohnen- bis welschnußgroße Lymphdrüsen zu fühlen.

Zur genaueren Orientirung über die Tiefenausdehnung der Geschwulst wurde auch eine Untersuchung mit dem akido-peirastischen Apparat vorgenommen. Die widerstandslos in ihrer ganzen Länge eindringende Nadel liefert den Beweis, daß die knöcherne Partie nicht nur des Processus alveolaris, sondern auch des harten Gaumens vom Neoplasma vollständig zum Schwund gebracht ist, während die linke Hälfte der Gaumenplatte und der hintere Theil des linken Zahnfortsatzes den Knochen noch vollkommen intact und von normaler Härte und Festigkeit zeigt.

Die Diagnose lautet auf eine carcinomatöse Neubildung,

und da auch die mikroskopische Untersuchung dies bestätigt, so wurde Tags darauf mit Hilfe der Morphinum-Chloroformnarkose die Resektion vorgenommen.

Vorher werden durch einen Bogenschnitt, dessen Richtung ungefähr dem Verlaufe des Musculus digastricus folgt, die verdächtigen Lymphdrüsen der Submaxillarregion rechts und links bloßgelegt und mit der Cooper'schen Scheere exstirpirt. Nach Stillung der ziemlich bedeutenden Blutung aus den rigiden und deswegen sich nur schwer retrahirenden Gefäßen wird die Wunde mit 10⁰/o Bismuthlösung gewaschen, und dann der Hautlappen mit Seidenligaturen befestigt. Als deckender Verband wird Sublimatgaze benützt.

Nun erst wird zur Operation am Kiefer selbst geschritten. Patient, der auf alle Fragen zwar etwas träge und langsam, einem Schwerhörigen ähnlich, aber doch in vollkommen passender Weise Antworten gibt ohne irgendwie Zeichen von Schmerz zu bekunden, wird in sitzende Stellung gebracht; sein Kopf von hinten her durch einen Assistenten fixirt und das Chloroform mittelst des Junker'schen Gebläse-Apparates, aber ohne Maske direkt mit dem Schlauche weiter gereicht.

Die Durchtrennung der Gesichtshautdecken geschah nach Dieffenbach'scher Manier nur mit der Modifizirung, daß der Schnitt parallel der Nase vom innern rechten Augenwinkel an bis zur Oberlippe geführt und letztere etwas rechts von der Mittellinie durchschnitten wird. Dem folgt die Ablösung des Velum palatinum von den Weichteilen des harten Gaumens durch einen Schnitt längs des hinteren Randes beider Gaumenbeine. Da sich jetzt durch Abpräpariren der Oberlippen und Gesichtsweichtheile die Apertura pyriformis vollkommen frei legen ließ, konnte von dieser aus ohne Mühe die Resektion des Vomer und der beiden Processus alveolares mittelst einer starken, gerade schneidenden Knochenzange ausgeführt werden in einer Höhe, welche dem mittleren Nasengange entspricht. Die einzige noch bestehende Verbindung des Oberkiefers mit dem

Keilbein wurde durch einen starken Druck nach abwärts losgeprengt und das abgetrennte Stück in toto entfernt. Zurück bleiben links sämtliche Nasenmuscheln, während rechts sowohl die untere als auch mittlere Muschel mit einer Luer'schen Zange abgezwickelt und auch Teile des Processus zygomaticus mit entfernt werden. Mund- und Nasenhöhle erscheinen nun in einen großen, annähernd viereckigen Raum verschmolzen; nur hinten ist durch den vollständig intakt gebliebenen weichen Gaumen die Scheidung in einen Nasenrachenraum erhalten.

Die Blutung im Munde war während der ganzen Operation sehr reichlich. Sie liefs sich indess mit Ligaturen und mit dem Thermokauter vollständig stillen und komplicirte die Operation nicht im Geringsten, da der Narkotisirte trotz vollkommener Analgesie soviel bewusste Willenskraft befaß, dafs er das Blut durch Hustenstöße immer aus dem Munde nach außen zu entfernen vermochte.

Zum Schlusse wird die ganze Wundfläche mit Jodoformpulver eingepudert und an Stelle des Gaumens eine dem herausgenommenen Knochenteile nachgeformte provisorische Prothese aus geglühtem Draht, dessen Gestelle dick mit Jodoformgaze überzogen ist, eingelegt. Auf die äußere Gesichtswunde, die durch Seidenligaturen vereinigt ist, wird ein nasser Salicylborverband gelegt.

Mit Hilfe dieser leicht federnden Vorrichtung, die den Kranken gar nicht zum Bewustsein über die Ausdehnung des durch die Operation gesetzten Substanzverlustes kommen läfst, vermag Patient schon am Abend des Operationstages Milch und Wein ohne besondere Anstrengung zu schlucken. Minder gut als das Schlucken gelingt das Sprechen und kann sich der Operirte nur schwer verständlich machen. Stündlich wird der Mund mit lauer Salycillösung ausgespült und für die Nacht Morphium injicirt.

26/XI. Temperatur: Morgens 37,6 Abend 38,1. Schlaf vielfach unterbrochen. Schmerzen unbedeutend. Appetit und

Allgemeinbefinden gut. Schlucken geht glatt vor sich. Zeitweise Würgbewegungen, doch ohne dafs es zu wirklichem Erbrechen kommt.

27/XI. Temperatur: Morgens 38,1; Abends 38,0. Die Prothese hat sich etwas verschoben, läfst sich aber leicht zu rechtbringen. Die Ausspülungen werden noch immer fortgesetzt. Sonst stat. id.

28/XI. Temperatur: Morgens 37,7; Abends 38,0. Der Verband auf den äufseren Wunden wird erneuert, da die Binden durch verschüttete Speifen beschmutzt sind. Die Wundränder erscheinen reaktionslos und überall gegenseitig miteinander verklebt. Prima intentia also fast mit Sicherheit zu erwarten. Die Würgbewegungen noch manchmal vorhanden. Allgemeinbefinden gut, Appetit lebhaft.

29/XI. Temperatur: Morgens 37,4; Abends 37,9. Nacht war etwas unruhig. Sonst st. id.

Gegen Mittag klagte Patient über Schmerzen im Epigastrium. Die Untersuchung ergab aufer mäfsiger Druckempfindlichkeit dieser Stelle nichts Abnormes im Abdomen. Zu den Schmerzen gefellten sich gegen Abend wiederum sehr heftige Würgeungen. Patient legt auf diese wenig Gewicht, da er schon seit einigen Monaten zeitweise von ähnlichen Brechbewegungen belästigt worden sei, doch ohne dafs dadurch in seinem Wohlbefinden eine besondere Störung veranlafst worden wäre.

Er erhielt wie bisher jeden Abend Morphinum und befand sich dann wieder ruhig.

30/XI. Morgens 2 Uhr werden die Schmerzen im Epigastrium plötzlich auferordentlich heftig, Patient sah sehr collabirt und anämisch aus und starb schon wenige Minuten, nachdem er die Wärterin gerufen.

Die Sektion ergab hochgradige Anämie und grofsen Fettreichthum sämmtlicher Organe. Die Lungen zeigten leichtes Altersemphysem, sonst keine krankhafte Veränderung. Die

Bronchen waren frei, die Schleimhaut derselben blaß anämisch. Das Herz ist in allen Durchmessern vergrößert, seine Wandung von entsprechender Dicke und Konsistenz, die Klappen normal und schlussfähig.

In der Bauchhöhle freie Flüssigkeit von schmutzig-brauner Farbe, mit schwarzen breiigen Flocken vermischt, von denen auch die Darmschlingen allenthalben beschmiert sind. Am Peritoneum weder auf dem visceralen noch parietalen Blatte Spuren einer Entzündung nachweisbar.

Als Ausgangspunkt des Flüssigkeits-Ergusses findet sich auf der Vorderfläche der Magenwand nahe der kleinen Kurvatur, 5 cm oberhalb des Pylorus eine hemdknopfgroße Oeffnung in der Serosa. Diesem Loche entspricht auf der Innenseite des Magens, ein Markstückgroßes, rundes Geschwür mit scharfgeschnittenen Rändern, das terrassenförmig durch Schleimhaut und Muskularis bis zur Serosa dringt. Der Bauchfellüberzug des Magens in der Umgegend des Geschwüres nicht entzündet noch verdickt.

Gegen den Pylorus zu ist noch ein zweites 20 pfennigstückgroßes rundes Magengeschwür vorhanden, dessen Grund aber nur bis zur Muscularis geht. Die Magenschleimhaut selbst ist sonst leicht injiziert, im Fundus mehrere stecknadelkopfgroße Petechien. Im ganzen Dünn- und Dickdarm eine pechschwarze Schmiere, die jedenfalls von eingedicktem und teilweise verdautem Blute herrührt.

Somit war die Todesursache eine Perforation der Magenwandung, bedingt durch ein rundes, nicht karcinomatöses Magengeschwür. Der mit der Perforation verbundene Shoc hatte genügt um die schon durch die Operation und durch die stattgehabte Magenblutung herabgesetzte Herzthätigkeit völlig zu erlahmen. Jedenfalls hatte das Geschwür schon längere Zeit bestanden, ohne aber besondere Symptome zu verursachen. Aber erst in den letzten Tagen konnte es bis

zur gefährlichen Tiefe, bis zur Scrofa vorgedrungen sein, da an dieser jede Spur einer reaktiven Entzündung fehlte.

Dafs das Geschwür nicht karcinomatöser Natur war, ward durch das Mikroskop festgestellt. Stellen wir zur besseren Uebersicht die von Heyfelder, Bosse, Siebert, Rabe und Helferich beobachteten Fälle von Oberkiefercarcinomen vergleichend nochmals zusammen, so erhalten wir folgende Tabelle.

Summe der Ober- kiefer-Carcinome	Summe der Carcinome am proc. alv.	Alter	Geflecht	Therapie	Erfolg
1. Nach Herzfelder 55	linksseitig	51	M	Refektion d. l. Alveolarfortsatzes.	Bleibende Heilung.
2.	rechtsseitig	3	M	Refektion d. r. Alveolarfortsatzes und des Nasenfortsatzes.	Bleibende Heilung nach 3 maliger Recidive.
3.	? seitig	56	M	Refektion d. hintern Teils d. Alveolarfortsatzes.	Heilung.
4.	linksseitig	66	M	Refektion d. l. Alveolarfortsatzes und des freien Randes d. l. Unterkiefers.	Tod nach 5 Tagen an Larynxkrebs.
5. Nach Boffe 35	rechtsseitig	49	M	Refektion d. r. Zahn- und Gaumenfortsatzes.	Dauernde Heilung.
6.	linksseitig	34	W	Refektion des linken hintern Zahnfortsatzes.	Dauernde Heilung.
7.	rechtsseitig	57	M	Refektion d. r. Zahn- und Gaumenfortsatzes.	Dauernde Heilung.
8. Nach Siebert 12	beiderseits	52	M	Refektion der untern Oberkieferhälften.	Dauernde Heilung.
9. Nach Rabe 83	beiderseits	45	W	Refektion des Alveolarfortsatzes.	Tod während der Operation.
10.	rechtsseitig	40	M	Refektion des rechten Alveolarfortsatzes.	Bleibende Heilung n. 1mal. Recidive.
11. nach Helfferich 23	rechtsseitig	58	M	Refektion des untern Teiles beider Oberkiefer.	Tod nach 5 Tagen an einem perforierenden Magenfehlwü.
208	11.		9	2	

Nach dieser Tabelle treffen also nur 5,3% sämmtlicher Oberkiefercarcinome auf den Processus alveolaris; ein Prozentsatz, der weder harmonirt mit der Unzahl der anderweitigen Erkrankungen: Periostitis, Necrosis etc., von denen dieser Teil so häufig heimgefucht wird, noch harmonirt mit der Summe von »den sich häufig wiederholenden Reizungen«, denen dieses Organ ausgesetzt ist. Aber auch an anderen Regionen des Körpers, auf die nicht minder solche gelinde und andauernde Schädlichkeiten einwirken, sehen wir dieses Mißverhältniß zwischen Reiz und Häufigkeit des Krebses. Wie selten findet sich primär Carcinom am Damm, am Nasenrücken der Brillenträger, an den durch die Schuld der Mode und Schuhkünstler so sehr mißhandelten Füßen. Am ersten Erythem, auf der Nase hie und da eine Erosion oder erysipelatöse Entzündung und an den Zehen die so beliebten Hühneraugen sind die Folgen der Mißhandlung, aber nur in verschwindend seltenen Fällen straft krebßige Entartung dergleichen Verfündigungen. Acusere Ursachen allein vermögen demnach die carcinomatöse Degeneration ebensowenig hervorzurufen, als z. B. Staubinhalationen im Stande sind die Tuberkulose der Lunge zu verursachen. Bei der absoluten Impfungs- und Uebertragungsunfähigkeit des Krebses aber fehlt auch jeder Grund zur Annahme eines specifischen contagiösen Krankheitskeimes und so bleibt nichts übrig als die Ursache des Carcinoms im Körper selbst zu suchen, im anatomischen Aufbau des Gewebes. Dafür spricht auch schon die große Neigung des Carcinoms zu Recidive selbst nach der sorgfältigsten und gründlichsten Exstirpation der krankhaften Partie.

An Stellen, wo die Epidermis allmählich in Mukosa sich wandelt, eine Epithelsart in eine andere übergeht, wo die Mannigfaltigkeit der Epithelforten noch gesteigert wird durch den Reichthum an Drüsen und Drüsenformen, der solche Uebergangsregionen charakterisirt: an der Lippe und am Nasenflügel, an der Cardia und am Pylorus, am Mastdarm und

Muttermund, an der weiblichen Brust hat der Krebs feinen eigentlichen endemischen Boden, und nur sporadisch zeigt er sich auch an anderen Körpertheilen. Er fehlt fast ganz an Regionen, wo die Epithelbedeckung einfachen Bau besitzt, wo nur eine einzige Drüsenform sich findet, wie an der Handfläche und Fußsohle. Nicht ein einziges unter den von Gurlt aufgeführten 11000 Carcinomen war von diesen Theilen ausgegangen.

Den Anstoß aber zu der gefürchteten und furchtbaren Wucherung gibt eine Gleichgewichtsstörung in der Ernährung der verschiedenen epithelialen Elemente. ein Bruderkrieg zwischen den Epithelforten der Platten-, Pflaster-, Cylinder- und Drüsenzellen, ein Grenzkrieg zwischen Epithel- und Bindegewebe. Und diese Störung ist gewöhnlich gegeben in der Altersinvolution des Körpers. Kummer und Sorge, die als Causalmomente der carcinomatösen Neubildung eine so hervorragende Stelle einnehmen, können doch auch nur dadurch wirken, daß unter ihrem Druck eben das Gespenst des Alters früher zu spucken beginnt als gewöhnlich. Und wenn man das runzeldurchfurchte, verwitterte Gesicht eines Bauersmannes mit dem glatten und glänzenden Gesichte des im gleichen Alter stehenden Stadtbewohners vergleicht, braucht man nicht immer ein scharftiges Rasirmesser zu suchen, um diesem die Schuld an einer so exquisiten Alterskrankheit, wie das Carcinom ist, aufzubürden.

Bei der Altersinvolution atrophirt das Bindegewebe sammt den in ihm enthaltenen Blutgefäßen, verkümmern für gewöhnlich und unter physiologischen Verhältnissen die von der Blutzufuhr so abhängigen drüsigen Organe. Deren Veränderung ist um so größer, je complicirter ihre Funktion, je reichhaltiger und subtiler ihre Circulationsverhältnisse waren. Deshalb zeigt sich auch die Atrophie und in ihrem Gefolge allenfallige durch sie gesetzte Störungen und Unregelmäßigkeiten der Funktion am frühesten und auffallendsten bei den am

kunstvollsten gebauten epithelialen Gebilden, in den Geschlechtsdrüsen. Erst später degenerirt beim Weibe die Brustdrüse, schwinden bei beiden Geschlechtern die Talg- und Haardrüsen. Mit ihrem Schwinden wird die Haut trocken und spröde, derb und runzlig, mit der Entartung der Haarbalge tritt der Kahlkopf in seine Rechte. Ist hingegen die Anordnung in den ernährenden Gefäßbahnen einfach gestaltet, dann hat die Altersinvolution nur geringe Veränderungen zur Folge. Die Epidermis der äußeren Haut, die Epitheldecke der Schleimhaut, wird von ihr fast gar nicht berührt, ja im Verhältniß zur Atrophie des Bindegewebes ist ihre histiogenetische Thätigkeit eher gesteigert, aber gleichmäßig über die gesammte Hautfläche hin, eben wegen der so wenig eingreifenden senilen Rückbildung an diesen Organen. Kommt es dann ausnahmsweise einmal dennoch zu einer circumscribten Ueberproduction von Epithelien, so hat diese auf der Haut und Schleimhaut keine besonderen Veränderungen zur Folge; die überschüssigen Epithelien werden einfach abgestoßen oder bilden schwielige oder hühneraugenähnliche Geschwülstchen.

Bleiben dagegen aus irgend einer Ursache (und die kann vielleicht gegeben sein durch oft wiederholten Blutzufluß, den häufig sich wiederholende Reize in den Organen veranlassen), bleiben wie gesagt aber die Epithelien der Drüsenapparate in ihrer bisherigen Funktionstüchtigkeit, während die anderartigen Gewebselemente mehr oder minder der Rückbildung anheimgefallen sind, dann kann der Ueberschuß von Epithelmassen, wenn sie nicht nach außen entleert werden, das verursachen, was wir eine carcinomatöse Neubildung nennen. Ungehindert ergießt sich jetzt der Strom der epithelialen Wucherung in die Maschen des atrophisch gewordenen Bindegewebes, das den Eindringling nicht mehr in sein Bett zurückzudämmen vermag. Zu wenig reaktionsfähig, um durch eine energische Entzündung der feindlichen Epithelinvasion den Nährboden zu untergraben und den Fremdkörper auszustossen, welches Ge-

schick im jugendlichen Organismus so häufig den Talgdrüsen und ihren Produkten zu Theil wird, antwortet der gealterte Körper gegen den Reiz nur mit einer hyperämischen Infiltration der Gewebe. Und diese reicht gerade hin, dem Epithel eine Art Matrix zu bieten und es dadurch nur zu energischerer Proliferation zu bringen.

In der grossen Mehrzahl der Fälle wird also die epitheliale Ueberproduction eine Schwielen-, eine Warzen-, ein Hühnerauge etc. bilden, in einer ebenso grossen Zahl von Fällen wird es zu einer eitrigen Entzündung und Ausstossung der eingewanderten Zellen kommen und nur in seltenen Fällen wird das Epithel die Verhältnisse so gelagert finden, dass es sich zu einem Carcinom entwickeln kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Verhältnisse vorhanden sind, steigt mit dem Reichtum und der anatomischen Verschiedenheit der Epithelien an irgend einer Körperregion; und zwar deswegen, weil an solchen Stellen bei der Altersinvolution am leichtesten eine Unregelmässigkeit in der Rückbildung und Function der epithelialen Elemente zu gewärtigen ist und damit das Uebergewicht der Drüsenzellen über das Bindegewebe und Deckepithel*) geschaffen wird.

Am drüsenarmen Processus alveolaris ist der Krebs ausserordentlich selten, trotzdem hier die äusseren Reize mindestens ebenso häufig sind, als an den vom Krebs am meisten bevorzugten Organen.

Das Durchschnittsalter der an Carcinom des Zahnfortsatzes Leidenden ist 50 Jahre, also ein bedeutend jüngeres als der übrigen Oberkieferkrebs-Kranken, die wenigstens nach der

*) In Gurlt Statistik von 11000 Carcinomen treffen:

18% auf das Gesicht und Oberkiefer, Schädel,

19% auf Magen-Darm,

36% auf die weibl. Geschlechtsorgane,

14% auf die weibl. Brustdrüse,

4% auf die übrige Haut,

Helferich'schen Tabelle erst in der Mitte der Sechziger Jahre an ihrem Uebel zu laboriren begannen.

Was die Diagnose des Carcinoma processus alveolaris betrifft, so wird selbe leicht und mit Sicherheit gestellt werden können, da das Terrain so offen liegt, daß nicht nur die makroskopische Untersuchung genau gemacht werden kann, sondern auch das Mikroskop in allen zweifelhaften Fällen zu Rathe gezogen werden kann.

Die Prognose ist ziemlich günstig und garantirt eine gründliche Entfernung des Krankhaften, eine fast sichere und bleibende Heilung.

Die oben verzeichneten Todesfälle fallen nicht der Schwere der Operation zu Schuld noch der Gefährlichkeit des lokalen Processes, sondern eben ganz unberechenbaren Zufällen.

Die einzig rationelle Therapie des Krebses besteht zur Zeit in der operativen Entfernung des Krankhaften.

Je früher und je weiter in den Grenzen des Gefunden die Exstirpation vollzogen wird, um so geringer ist die Gefahr einer Recidive, um so wahrscheinlicher absolute Heilung. Bleiben auch nur Reste des Aftergebildes in den Wundrändern zurück, so werden diese Keime genügen, um von Neuem die Wucherung ins Leben zu rufen. Diefes zeigt der von Billroth operirte Kranke, der erst nach einmaliger Recidive vollkommene Genesung erlangte, beweist noch deutlicher Soulé's Patient, bei dem die Operation 4 mal gemacht werden mußte, ehe die Heilung dauernd blieb.

An und für sich ist die Refektion des Zahnfortsatzes eben wegen seiner zugänglichen Lage nicht schwierig und in einer Zahl von Fällen schon von der Mundhöhle aus vorzunehmen; freilich nur, wenn das Carcinom auf den Processus alveolaris allein beschränkt ist. Da aber die Kranken nur sehr selten sich so frühzeitig zu einer blutigen Operation entschließen und den Arzt erst dann zu Hilfe rufen, wenn das Carcinom tiefe Zerstörungen angerichtet hat, so wird für gewöhnlich der Ein-

griff sich nicht auf den Zahnfortsatz beschränken dürfen, sondern eine mehr oder weniger ausgedehnte Oberkieferrefektion ausgeführt werden müssen. Und hierin hat die Technik eine hohe Vollendung erreicht. Es ist nicht nur die äußere Schnittführung so vereinfacht, daß die nach der Operation bleibende Entstellung kaum in die Augen fällt, auch der Ersatz des verlorenen Gaumens wird durch Prothesen und künstliche Gebisse ein so vollkommener, daß selbst die Funktionsstörung im Sprechen und Schlucken auf ein Minimum herabsinkt.

Bisher wurden derartige Prothesen erst nach völliger Vernarbung der Wundflächen eingelegt. Ich habe in der Litteratur nur eine einzige Mitteilung finden können, wo ähnlich dem Helferich'schen Falle schon gleich nach der Refektion eine Gaumenplatte aus Guttapercha eingeführt und erst ein Monat später durch ein bleibendes Ersatzstück aus Kautschuk ersetzt wurde. *)

Die Vorteile einer derartigen Nachbehandlung liegen offen und klar da: einerseits erleichtert die provisorische Prothese das Schlucken und vermindert dadurch die Gefahr einer Fremdkörperpneumonie, andererseits schützt sie die Wundfläche vor Läsionen durch die Zungenbewegungen und verhindert zugleich eine nicht gewünschte Verwachsung der Operationsstellen; und drittens, und das ist nicht der geringste Vorzug, ist es nur mit Hilfe einer derartigen Vorrichtung, wie sie Helferich anwendete, möglich, constant ein Antisepticum auf die Wunde einwirken zu lassen. Auch die Leichtigkeit und Schnelligkeit, mit der sich der Operateur in wenigen Minuten und eigenhändig und mit den allergewöhnlichsten Mitteln eine solche Prothese formen kann, bietet eine weitere Garantie für den Werth und die Brauchbarkeit dieser Methode.

*) Rapport sur un travail de M. Combalat intitulé: Memoire sur la resection de maxillae superieure, suivi de quatre observations par Polaillon. Bull. de la soc. de chir. 1881. Nr 12.

Die Frage, ob bei Oberkieferrefektionen die Narkose angezeigt erscheint, ist gegenwärtig zu Gunsten derselben entschieden. Dafs sie nicht ganz ohne Gefahr ist, lehrt die Kranke Längenbecks. Jedenfalls wird die Gefahr des Bluteinfließens in die Trachea am einfachsten vermieden durch die Anwendung der Nufsbaum'schen Analgesie, der kombinierten Morphium-Chloroformnarkose. Denn wenn dieselbe auch nicht bei jedem Patienten so glänzend gelingen wird wie bei Helferich's Operation, so ist doch durch sie die Refektion so wenig aufgehoben und complicirt, dafs sie bei einem derartigen Eingriff immer versucht werden soll. Und die zu gleichem Zwecke, nämlich zur Vermeidung des Bluteinflusses in die Luftröhre, von Verneuil angegebene Tamponade der Choanen ist eben nur selten ausführbar, und die von Trendelenburg angewendete Tracheotomie eben doch viel eingreifenderer Natur als die harmlose subcutane Morphinumjection.

Aufser den schon im Texte erwähnten Büchern wurde ferner benützt: Hyrtl, Lehrbuch der Anatomie, Uhle und Wagner, Handbuch der allgemeinen Pathologie, und Perls pathologische Anatomie.

Zum Schlusse erübrigt mir noch die angenehme Pflicht, meinen hochverehrten Lehrern, Herrn Geheimrath Dr. Ritter von Nufsbaum für die freundliche Uebernahme des Präsidiums sowie Herrn Professor Dr. Helferich für die gütige Ueberlassung des statistischen Materiales und die persönliche Unterstützung, mit der er mir bei dieser Arbeit zur Hand ging, meinen innigsten Dank auszusprechen.



